Stoller	REGISTRO		
Boletín Técnico:	VERSIÓN	CLAVE	PÁGINAS
	B.1	S072-L1-P0-0012	3 de 3

Balanceador® de Nitratos

Fertilizante Inorgánico - Líquido
Registro COFEPRIS RSCO-0511/XI/99

***Balanceador de Nitratos*®** es un producto diseñado para propiciar una efectiva descarga o traslocación de fotosintatos del follaje y órganos aéreos hacia los órganos de almacenamiento de reservas (coronas, tallos, tubérculos, bulbos y raíces).

También es altamente efectivo para controlar y reducir el vigor del crecimiento vegetativo en cultivos con exceso de fertilización nitrogenada (Nitratos), con excesiva producción de hormonas (auxinas y giberelinas), o en el caso de patrones, cultivares o variedades muy vigorosas.

Composición Garantizada	**% p/p**
Boro (B).....	9.000%
Molibdeno (Mo).....	0.008%

Ventajas de Uso de *Balanceador de Nitratos*®:

- Permite controlar el vigor excesivo de crecimiento, reduce la distancia de los entrenudos, dando estructura a la planta.
- Efectivo corrector de deficiencias nutricionales de Boro.
- Excelente traslocador de azúcares para un mejor llenado de los órganos de almacenamiento como: coronas, tubérculos, raíces, rizomas, bulbos, etc.
- En el caso de Patrones o variedades muy vigorosas, controla el exceso de crecimiento y favorece la entrada a la etapa reproductiva.
- Un eficiente traslocador de alimentos hacia las yemas en el caso de plantas caducifolias en etapa de hibernación.
- Mejora las características de calidad de los frutos en cuanto a peso y Grados Brix.

Instrucciones de Uso:

CULTIVOS	DOSIS (L/Ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa	3.0 - 4.0	Hacer 2 aplicaciones, 30 y 20 días antes de la cosecha.
Cebolla, Ajo, Zanahoria y Betabel	3.0	Hacer 2 aplicaciones, 30 y 20 días antes de la cosecha.
Espárrago	3.0 - 4.0	Hacer 2 aplicaciones, 30 y 20 días antes de desvare para cosecha. Se recomienda una 3ra. aplicación 30 días antes de dormancia.
Maíz	2.0 - 3.0	Hacer 1 aplicación en etapa de grano lechoso-masoso.
Soya	1.5 - 2.0	Hacer 1 a 2 aplicaciones antes del inicio de floración. Aplicar a intervalos de 8 días.

Jícama	2.0 3.0	Aplicar en Prefloración para reducir la inducción floral. Hacer 2 aplicaciones para llenado del tubérculo 30 y 20 días días antes de cosecha.
Fresa	3.0 0.5 - 1.0	Plántula en Vivero: Hacer 1 aplicación 25 días antes de extracción para trasplante. En planta establecida se recomiendan aplicar en atapa de estoloneo, para reducir vigor vegetativo y tener más brote reproductivo.
Frambuesa	3.0	Aplicar antes de la poda para traslocar azúcares del follaje y concentrar las reservas en la corona.
Zarzamora	1.0 L / 200 L Agua	Se recomiendan 2 aplicaciones para lignificar primocañas, 14 días antes de la defoliación con intervalos de 7 días.
Piña	4.0 L / 3,000 L Agua	Hacer 2 aplicaciones 40 y 25 días antes de la inducción floral. Efectivo para frenar vigor vegetativo y tener una mejor respuesta a la inducción floral.
Aguacate	3.0 L / 2,000 L Agua	Se recomiendan de 2 a 3 aplicaciones en la etapa de brotación, para reducir vigor vegetativo e inducir floración, las aplicaciones a intervalos de 21 días.
Limón	2.0 L / 400 L Agua	Se recomiendan 2 aplicaciones en etapa de brotación, 30 días antes de la inducción floral a intervalos de 15 días.
Mango	3.0 L	Hacer 2 aplicaciones en etapa de brotación, para uniformizar y sazonar el brote vegetativo, aplicar 45 y 30 días antes de la inducción floral.
Agave	4.0 L	Hacer 2 aplicaciones, 35 y 25 días antes de cosecha (Jima), para mejorar el contenido de azucares en la piña (más grados Brix).

Corrección de Deficiencias Nutricionales

CULTIVOS	DOSIS (L/Ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Hortalizas	0.5 - 1.0	La corrección de deficiencias debe ser en base a análisis foliar o de suelo. La mayor demanda de Boro y Molibdeno es en floración, fructificación y llenado de grano, momento crítico para corregir deficiencias.
Frutales	1.0 - 1.5	
Granos	0.5 - 1.0	

Orden de Mezcla:

1. Agua **2. *Balanceador de Nitratos*®** **3. Plaguicida**

GARANTÍA: ***STOLLER MÉXICO, S.A. DE C.V.*** GARANTIZA QUE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL PRODUCTO CORRESPONDEN ÍNTEGRAMENTE A LAS EXPRESADAS EN LA ETIQUETA, LAS CUALES ESTÁN RESPALDADAS POR ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD, POR LO QUE MANIFESTAMOS QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA LOS FINES RECOMENDADOS, SIEMPRE Y CUANDO SE ADQUIERA EN SU ENVASE ORIGINAL Y QUE EL SELLO DE GARANTÍA SE ENCUENTRE INTACTO. DADO QUE EL MANEJO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MEZCLADO Y APLICACIÓN ESTÁN FUERA DEL CONTROL DE ***STOLLER MÉXICO, S.A. DE C.V.***, LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS RESULTANTES DE ELLO, ASÍ COMO DE ACCIDENTES O DESVIACIONES DE USO POR LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LAS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN INDICADAS EN LA ETIQUETA.