"USO AGRÍCOLA"

# ARKANIS®

| IRAC | 4A + 3A |
|---|---|

imidacloprid + bifentrina
Insecticida - Granulado

| "COMPOSICIÓN PORCENTUAL" | % EN PESO |
|---|---|
| Ingrediente activo | |
| Imidacloprid<br>(E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina<br>(Equivalente a 4 g de i.a./kg) | 0.4 |
| Bifentrina<br>2-metil-3-fenilbencil (1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)<br>-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato<br>(Equivalente a 3 g de i.a./kg) | 0.3 |
| Ingredientes inertes | |
| Portador, adhesivo, agente de fluidez y colorante | 99.3 |
| Total. | 100.0 |

CATEGORIA 4 – NOCIVO SI SE INHALA

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"
"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

ARKANIS® es una mezcla de insecticidas formulado como granulado y diseñado para el control de las siguientes plagas tal como se indica a continuación:

RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVOS | PLAGAS | DOSIS kg/ha | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| Sorgo, Arroz, Avena, Cebada, Maíz, Trigo (14) | Gallina ciega (*Phyllophaga ravida*) | 23.0 a 30.0 | Se recomienda realizar una aplicación al fondo del surco, al momento de la siembra. Periodo de protección por al menos 25 días. |
| Maíz (SL) | Gallina ciega (*Phyllophaga menetriesi*) | 25.0 a 30.0 | Se recomienda realizar una aplicación al fondo del surco, al momento de la siembra. |
| Caña de azúcar (30) | Ninfas de Mosca Pinta (*Aeneolamia postica*) | 16.0 a 24.0 | Se recomienda realizar una aplicación dirigida a la base de la cepa de cada planta. |
| Agave (No aplicar en plantaciones mayores a 5 años) | Colaspis (*Colaspis spp.)*<br>Gallina ciega (*Phyllophaga ravida)*<br>Diabrotica *(Diabrotica sp.)* | 20 - 25 | Realizar una aplicación en banda de la siguiente manera: realizar dos surcos pequeños de 5 cm de profundidad y 15 cm de ancho a cada lado de la línea de las plantas de agave, depositar el producto al fondo del surco y, después de la aplicación, cubrir con suelo, iniciar al momento en que comienza el temporal de lluvias. |

( ) Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha.
(SL) Sin Límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS
Se puede reingresar a las áreas tratadas 12 horas después de la aplicación del producto.

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Durante el manejo, preparación de la mezcla, aplicación, llenado y lavado de los equipos de aplicación, del producto ARKANIS®; siempre utilice el equipo de protección personal completo señalado en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de esta etiqueta. Para abrir el saco, quite la costura de la parte superior. ARKANIS® es un insecticida que viene listo para su uso. Puede ser aplicado con equipos terrestre montados al tractor (gandy), equipos motorizados o equipos manuales, incluyendo los de tipo salero. Para obtener aplicaciones uniformes, siempre calibre su equipo de aplicación. Una vez calibrado, agregue en la tolva o depósito la cantidad de producto autorizado. Para medir la cantidad exacta de producto a aplicar, utilice una báscula. Se recomienda hacer las aplicaciones cuando el suelo tenga buenas condiciones de humedad.

CONTRAINDICACIONES
ARKANIS® no es fitotóxico al cultivo y a las dosis aquí indicados. No aplique en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea alta.

INCOMPATIBILIDAD
No mezcle ARKANIS® con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclarlo, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente en los cultivos recomendado en la etiqueta haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

"Manejo de Resistencia"
"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL"